




กรุงเทพมหานคร



ทั้งชีวิต...เราดูแล

ขั้นตอนการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า



กรุงเทพมหานคร



ทั้งชีวิต...เราดูแล

ชุดอุปกรณ์ออกหน่วย

1. กระบอกฉีดยา (Syringe) ขนาด 1 ml.
2. หัวเข็มสำหรับดูดวัคซีนเบอร์ 22 ขนาด 1 นิ้ว
3. ภาชนะบรรจุสารละลาย และแอลกอฮอล์ 70%
4. กระติกบรรจุวัคซีน และกอนนาแข็ง (Ice Pack)
5. หน้ากาก (Mask)
6. เจลล้างมือ
7. ถุงมือยาง
8. วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เก็บในตู้แช่เย็น 2-8 องศาเซลเซียส
9. ใบรับรองการฉีดวัคซีนพร้อมเหรียญ
10. แบบกรอกบันทึกรายละเอียดสัตว์ที่รับการฉีดวัคซีน



ขั้นตอนการเตรียมการออกหน่วย

เตรียม Ice Pack วางด้านล่าง
และด้านข้างของกระติก



วางวัคซีนระหว่าง Ice Pack



วาง Ice Pack ไว้ด้านบน



ปิดฝากระติก



ขั้นตอนการฉีดวัคซีน

นำวัคซีน
ออกจากกระติก



สวมถุงมือยาง



เตรียมกระบอก
ฉีดยา 3 cc.



ใส่หัวเข็มเบอร์ 22
กับกระบอกฉีดยา



นำวัคซีนออก
จากกระติก



ขั้นตอนการฉีดวัคซีน (ต่อ)



วิธีจับบังคับสุนัข



1. ใช้มืออ้อมมากอดบริเวณต้นคอ โดยให้สุนัขแนบชิดกับตัว
2. ใช้มืออีกข้างกอดบริเวณสะโพกด้านหลังสุนัข



กรุงเทพมหานคร

วิธีจับบังคับแมว



มือขวาจับ
ที่หนังคอให้แน่น



มือซ้ายรวบ
สองขาหลัง



กรุงเทพมหานคร

วิธีจับบังคับแมว (ต่อ)



ใช้ผ้าหอดคลุมเท้าทั้งสี่ข้าง



ใช้สวิงครอบ



ให้เกาะบนต้นไม้
ดึงหนังคอให้แน่น



กรุงเทพมหานคร

การใช้เชือกผูกปากสุนัข



มัดเชือกให้เป็นปวง

ให้ปวงคล้องอยู่ประมาณ
กึ่งกลางปากและปมอยู่
ด้านล่าง ดึงเชือกให้ตึงมือ

รวมปลายเชือกผูกเป็น
เงื่อนกระดุกไว้ด้านหลัง



กรุงเทพมหานคร

วิธีการฉีดวัคซีนเข้าตัวสัตว์



แหวกขนสัตว์ให้เห็น
ผิวหนังอย่างชัดเจน



ใช้แอลกอฮอล์เช็ด
ที่ผิวหนังสัตว์ เพื่อฆ่าเชื้อ



มือซ้ายดึงหนังขึ้นเล็กน้อย



มือขวาแทงเข็มเข้าใต้ผิวหนัง
แล้วดันกระบอกสุบ ให้วัคซีน
เข้าสู่ตัวสัตว์



ดึงกระบอกฉีดยาออก
พร้อมใช้แอลกอฮอล์
เช็ดบริเวณที่ฉีดอีกครั้ง





กรุงเทพมหานคร

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการฉีดวัคซีน




ทั้งชีวิต...เราดูแล

- ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด
- ควรฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า เมื่อสัตว์มีอายุ 3 เดือนขึ้นไป
- ฉีดวัคซีนกระตุ้นภูมิคุ้มกันโรคครั้งที่ 2 หลังจากครั้งแรก 1 เดือน
- กรณีฉีดวัคซีนในสัตว์อายุ 2 เดือนหรือต่ำกว่า 3 เดือน ให้นำฉันทมาฉีดวัคซีนกระตุ้นอีกครั้งหลังจากครั้งแรก 1 เดือน
- จากนั้นฉีดกระตุ้นภูมิคุ้มกันโรคปีละ 1 ครั้ง
- งดอาบน้ำหลังจากฉีดวัคซีนเป็นเวลา 7 วัน
- ให้สังเกตอาการแพ้วัคซีนในสัตว์หลังฉีดวัคซีน 15 นาที



กรุงเทพมหานคร

สิ่งที่เจ้าหน้าที่ ศบส. ต้องเตรียม



ทั้งชีวิต...เราดูแล

1. ชุดกล่องอุปกรณ์ออกหน่วย



2. กระจกบรรจุวัคซีนที่ใส่ Ice Pack



3. บุคลากร 2 คน ได้แก่ พยาบาล และผู้ช่วย



ข้อควรรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า

1. ทาวัดขึ้นโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขเท่านั้นใช่หรือไม่?

= สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด สามารถติดโรคพิษสุนัขบ้าได้ จง
ควรฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้กับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด

2. หลังคนถูกสุนัขบ้ากัดจะเริ่มแสดงอาการเมื่อไหร่?

= ตั้งแต่ได้รับเชื้อจนแสดงอาการ อาจใช้ระยะเวลาฟักตัวต่างกัน
ตั้งแต่ 4 วันถึง 4 ปี โดยผู้ป่วยประมาณ 70% จะเป็นโรคนี
ภายใน 3 เดือนหลังถูกกัด และประมาณ 96% จะเป็นโรคนี
ภายใน 1 ปีหลังถูกกัด

ข้อควรรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า

3. สัตว์ที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าจะมีอาการอย่างไร?

- ระยะที่ 1 : สุนัขจะมีอาการเซื่องซึม โดยเปลี่ยนแปลงนิสัย
เป็นแบบก้าวร้าวและดุร้ายประมาณ 2-3 วัน
- ระยะที่ 2 : สุนัขจะมีความก้าวร้าวและดุร้ายขึ้นอย่างชัดเจน กัด
ทุกอย่าง น้าลายไหลยืด กินน้ำกินอาหารไม่ได้ สง
เสียงรอกโหยหวน เกิดการอัมพาตของกล้ามเนื้อ
หลายส่วนประมาณ 1-7 วัน ซึ่งเป็นระยะการแพร่โรค
ที่สำคัญ เพราะผู้เลี้ยงอาจมีโอกาสสัมผัสโรคได้ง่าย
- ระยะที่ 3 : สุนัขจะตายเนื่องจากกล้ามเนื้อในการควบคุมระบบ
การหายใจเป็นอัมพาต โดยใช้เวลาประมาณ 2-4 วัน

ข้อควรรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า

4. ถ้าถูกสัตว์กัดหรือข่วน ต้องทำอะไรบ้าง?

- ล้างแผลด้วยสบู่และน้ำเป็นเวลา 10 นาที หากมีเลือดออก ควรปล่อยให้เลือดไหลออก อย่าบีบหรือเค้นแผล เพราะอาจทำให้เชื้อแพร่กระจายไปยังส่วนอื่นได้
- ใส่ยา เช่น เบตาดีน ทิงเจอร์ไอโอดีน แอลกอฮอล์ 70% ไม่ควรเย็บแผลทันที ควรรอไว้ 3-4 วัน แต่หากเลือดออกมาก หรือแผลมีขนาดใหญ่อาจเย็บแผลหลวมๆ และใส่ท่อระบายไว้
- กักดูอาการสัตว์ โดยให้น้ำและอาหารตามปกติอย่างน้อย 14 วัน ให้แจ้ง สสธ. 0-2245-3311 หรือสายด่วน กทม. 1555 ทันที
- พบแพทย์ทันทีที่ถูกกัด

สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข

